



Населяют Индию, Шри Ланка, Бирму и п-ов Малакка.

Длина до 8 см.

Тело вытянуто в длину, более или менее высокое, бока сильно уплощены, профиль брюха сильно выгнут, киль острый. Спинной плавник и анальный плавник отнесены к хвостовому стеблю. Грудные плавники мощные, крупные, первые лучи брюшных плавников удлинены.

Окраска зависит от места происхождения. Спина серо-зеленая, бок серебристый с зеленоватым, голубоватым или золотистым отливом. Начинаясь перед спинным плавником до основания хвостового плавника идет продольная блестящая линия, меняющая свой цвет от зеленого до черного в зависимости от освещения. Она может оканчиваться черным пятном в золотистой окантовке. Над этой линией идет узкая золотистая полоса, которая начинается у жаберной крышки.

Плавники бесцветные, реже оранжевые до коричневых или серые до черных.

Самец стройнее, самка полнее.

На нерест сажают 1 самца и 2 самки или группу рыб с преобладанием самок. Несколько широколистных и плавающих со свисающими корнями растений, куда рыбы откладывают икру.

Вода для разведения: 26-28°C, понизить dH на 2-3°, pH 6,5-7.

Самка мечет до 100 икринок, которых рыбы почти не преследуют.

Инкубационный период 1 сутки, мальки плывут через 3-4 суток.

Стартовый корм: коловратки, мелкие науплии циклопа.

Половая зрелость в 5-8 мес.