

Многие ихтиологи считают, что это мутация данио рерио. В природе не обнаружен.

Длина до 5 см.

2 пары усиков. Основная окраска тела серо-белая до золотистой, с многочисленными темными пятнышками, которые на хвостовом стебле могут образовать продольную полосу. Плавники желтоватые, могут быть с мелкими темными крапинками. Самка окрашена значительно светлее самца.

Рыбы держатся во всех слоях воды.

Вода: 18-24°C, dH 5-20, pH 6-7,5.

Перед посадкой на нерест самцов и самок держат 7-10 дней раздельно и хорошо кормят живым кормом. На нерест можно сажать пару, но лучше 2 самцов и 1 самку или группу рыб с преобладанием самцов. Нерестовый аквариум от 30 л на пару рыб с сепараторной сеткой и мелколистными растениями. Вода свежая, с теми же параметрами, что и при содержании, уровень 8-10 см.

Рыб сажают вечером и поднимают температуру на 2-3°C. Нерест обычно происходит утром при восходе солнца или при включении освещения. После нереста рыб отсаживают, сетку и растения, отряхнув с них икру, убирают. Инкубационный период 2-5 суток, мальки плывут через 3-7 суток.

Стартовый корм: инфузории, коловратки.

Половая зрелость в 4-6 мес.