



Населяют лесные ручьи и реки южной части Камеруна.

Длина до 6 см.

Тело вытянуто в длину, умеренно уплощено с боков. Самец более высокий, с лучше развитыми плавниками, верхние лучи хвостового плавника немного удлинены. Тело интенсивного голубого цвета, от верха глаза до спинного плавника идет оранжевая полоса. Внешняя часть плавников от желтого до оранжевого цвета, на спинном плавнике и анальном плавнике два, а на хвостовом плавнике три ряда оранжевых точек. У самки тело и округлые плавники окрашены бледнее.

Стайные рыбы, требовательны к содержанию кислорода и движению воды. Держатся в верхнем и среднем слоях воды. Предпочтительно содержать большой стаей в видовом аквариуме с большим пространством для плавания, местами заросли, обеспечивающие тенистые места, а также коряги и строения из камней, образующие щели.

Вода для содержания: 22-25°C, dH 10-20°, pH 6,5-7,5. Г. Штерба указывает, что при содержании в мягкой воде часты случаи заболевания туберкулезом.

Корм: живой, заменители.

Нерест как в видовом, так и нерестовом аквариуме. Самка откладывает клейкие икринки (30 и более шт.) на мелколистное растение у поверхности воды, а также в щели коряг и камней.

Вода для разведения: 23-26°C, dH 10-15°, KH до 3°, pH 6,5-7.

Субстрат с икрой переносят в инкубатор. Инкубационный период 10-14 суток. Стимулирует выклев мягкая, свежая воды.

Стартовый корм: инфузории, коловратки.

Половая зрелость в 10 мес.