Населяет южную часть Японии, Корею, о. Тайвань и прибрежную часть Китая.

Длина до 5 см.

Тело вытянуто в длину, профиль спины почти прямой, с боков уплощено. Спинной плавник отнесен далеко назад.

Основная окраска тела серая, переливающаяся зеленоватым или голубоватым тоном. Вдоль бока идет узкая темная продольная полоса. Плавники прозрачные с оранжевой каймой.

Имеется золотистая и красная селекционные формы. Самец мельче, стройнее, спинной плавник на конце заострен.

Мирные стайные, подвижные пугливые рыбы, держатся в верхнем слое воды. Лучше содержать в видовом аквариуме, местами заросли.

Вода для содержания: 20-25°C, dH 8-18°, pH 7-8. Р. Бах и А. Полонский рекомендуют добавить соль 1г/л.

Корм: живой, заменители.

Нерест парный или групповой с преобладанием самок.

Нерестовый аквариум от 20 л на пару рыб, в нем кусты мелколистных и плавающих растений.

Вода для разведения: 25-30°C, dH 7-11°, pH 6,8-7,2.

Если содержались в подсоленной воде, то такая же вода и в нерестовом аквариуме. Нерест порционный, самка мечет обычно ранним утром 14-30 икринок, которые приклеившись свисают с ее брюха в виде виноградной грозди и затем приклаеваются к растениям, когда самка через них проплывает.

Инкубационный период 10-12 суток. Рыбы при хорошем питании мальков и икру не трогают.

Стартовый корм: инфузории.

Половая зрелость в 10 мес.