Населяют п-ов Флорида. Держатся в болотах и прудах с чистой водой.

Длина до 8 см, в аквариуме меньше.

Тело вытянуто в длину, довольно высокое, уплощено с боков, хвостовой стебель высокий. Хвостовой плавник веер.

Самец оливковый до коричнево-зеленого цвета, с рядами блестящих пятнышек от голубого до желто-зеленого цвета. Спинной плавник и анальный плавник желтоватого до зеленоватого цвета с красно-коричневыми пятнышками или полосами, хвостовой плавник от красного до голубоватого цвета, часто с темной каймой и красными пятнышками.

Самка желтоватая с темными пятнами, образующими рисунок шахматной доски.

Самцы драчливы, в период нереста образуют территорию. Рыбы держатся в среднем и нижнем слоях воды. Видовой аквариум, грунт - песок, местами заросли растений для укрытия.

Вода для содержания: 17-24°C (В.Зоммер (АТ 10/79) отмечает, что колебания температуры ночью (17°C) и днем (23°C) благоприятно действует на рыб), dH 10-20°, pH 7-7,5, в некоторых литературных источниках рекомендуется добавление поваренной соли до 2 г/л.

Корм: живой, растительный, заменители.

Для пары рыб нерестовый аквариум длиной от 30 см с уровнем воды 15 см, грунт - мелкий песок, несколько кустов мелколистных растений. У готовой к нересту самки бледнеет рисунок темных пятен, а брюхо становится округлым. Одни из них роют ямку в песке, другие нет.

Икру (до 300 шт.) мечут на песок или растения. После икрометания самку удаляют, за икрой ухаживает самец.

Инкубационный период 3-7 суток. После выклева личинок самца удаляют.

Стартовый корм: науплии артемии, нематоды.

Половая зрелость в 9-12 мес.