



Населяют стоячие и медленно текущие болотистые водоемы восточной части Камеруна. Не сезонный вид.

Длина до 6 см.

Самец от зеленого до зелено-голубого цвета, иногда с красным отливом. На боковой части головы и на жаберной крышке извилистые красные штрихи, на передней части тела ряды красных точек, а на задней - поперечных штрихов. Анальный плавник и нижняя часть хвостового плавника с насыщенной желтой каймой, средняя часть хвостового плавника голубая с красными точками или поперечными штрихами. Верхний и нижний концы хвостового, концы спинного и анального плавников заострены. Самка коричневатая с рядами красноватых точек на боку и основании плавников.

Афиосемионов можно содержать в общем аквариуме, но там они не проявят себя полностью ни в окраске, ни в способе поведения. Лучше видовой аквариум с 1 самцом и несколькими самками или аквариум с другими карпозубыми, причем виды должны занимать разные слои воды. Аквариум с грунтом, который желательно прикрыть вываренным торфом, местами заросли, а также плавающие растения, и достаточно открытого места для плавания, можно положить коряги. Сверху аквариум следует накрыть, т.к. бывают случаи выпрыгивания рыб.

Вода: 22-24°C, dH 4-12°, pH 5,5-7, уровень до 25 см. При смене воды следует учесть, что рыбы чувствительны к изменению ее параметров. Некоторые аквариумисты рекомендуют добавить в воду поваренную соль (1,5 г/л).

Корм: живой (предпочтительно мотыль, коретра, трубочник, энхитреус, дождевые черви), можно нежирную говядину. Рачков (дафния, циклоп) и заменители берут не все рыбы.

По способу размножения рыб можно подразделить на две основные группы. У одной икра развивается без диапаузы, у другой - с ней. Имеется группа рыб, икра которых может развиваться как без диапаузы, так и с ней.

Рыбы держатся в среднем и нижнем слоях воды, некоторые экземпляры самцов агрессивны ко всем другим рыбам.

Нерестовый аквариум от 5 л. Рыбы мечут икру на растения и на грунт. Х.Фрей указывает, что предпочитают метать икру на грунт, но если он крупный, то на корни плавающих растений. М.Ильин пишет: "Есть указания, что рыбы погибают при повышении pH до 6,5-7,0 и что икра может храниться в торфе до 1,5 мес.

Инкубационный период в воде 12-18 суток.

Половая зрелость в 2-3 мес.