Населяют рисовые поля Таиланда.

Длина до 7 см.

Тело темного, оливково-коричневого цвета с блестящими зелеными пятнышками на чешуе. Анальный и хвостовой плавники темно-красные с зелено-голубыми полосами вдоль лучей. Спинной плавник блестящего зелено-голубого цвета с косыми темными полосами между лучей. Брюшные плавники коричневатые с белыми кончиками. Самец с более крупными плавниками, у самки на теле часто неправильной формы поперечные полосы.

Рыбы довольно мирные, держатся в среднем и верхнем слоях воды. Можно содержать группой. При постройке гнезда, нересте и уходе за потомством самец очень агрессивен.

До 200 мальков. Скрещивается с петушком.

Нерест парный как в общем, так и в нерестовом аквариуме. У одной группы рыб самец строит на поверхности воды гнездо из пены, под которым происходит икрометание, затем он ухаживает и защищает от других рыб икру и личинок.

Нерестовый аквариум длиной от 25 см для пары, без грунта, с темной подложкой, несколькими к устами растений для самки и плавающими растениями. Пару перед посадкой на нерест в течение недели держат раздельно. Сначала сажают самца, затем через несколько часов самку с припухшим брюхом.

Температуру воды поднимают на 2-3°С. После нереста самку удаляю т, а самца - когда поплывут мальки. Инкубационный период 1-2 суток, мальки плывут через 1-5 суток. Уровень воды понижают до 5 см или переводят мальков в выростной аквариум с таким же уровнем воды, который затем повышают по мере роста мальков.

Стартовый корм: живая пыль.

У другой группы рыб самец инкубирует во рту. Нерестовый аквариум с мелким грунтом, местами зарослями и плавающими растениями, можно с пещерой. Пара образует территорию, защищая ее от других рыб в общем аквариуме. Икрометание обычно над свободным, затененным участком грунта. Самец инкубирует икру во рту, спрятавшись в укрытие. В общем аквариуме самка охраняет территорию, в нерестовом ее можно удалить. Мальки выплывают через 9-12 суток.

Стартовый корм: мелкие науплии циклопа, артемии.