



Населяют северную часть среднего и нижнего течения бассейна р. Амазонка.

Длина до 7 см.

Имеется жировой плавник.

Спина от бежевого до коричневатого цвета, брюхо серебристо-белое. По всему телу идет широкая черная полоса, переходящая на нижнюю лопасть хвостового плавника, а над ней золотистая. Рыло красное. Полоса на хвостовом плавнике обрамлена красными штрихами. Спинной плавник прозрачный. Анальный плавник красноватый, снаружи голубоватый.

У самца анальный плавник скруглен, а брюшной плавник с белым кончиком.

Рыбы плавают держась в наклонном положении головой вверх.

При разведении вода: 24-28°C, dH до 4°, pH 6-6,5.

Нерест парный или групповой с преобладанием самцов. Перед посадкой на нерест самок и самцов держат 2 недели отдельно. Нерестовый аквариум длиной от 40 см для пары, с уровнем воды 10-15 см. На дне сепараторная сетка, на ней кусты мелколистных растений. Самка мечет в среднем 40-80 икринок. После нереста рыб удаляют, т.к. поедают икру. Инкубационный период 1-2 суток, мальки плывут через 2-6 суток.

Стартовый корм: живая пыль. Слабая аэрация для перемешивания корма.

Половая зрелость в 7-11 мес.