



Размер до 7 см.

Обитает в Юго-Восточной Бразилии.

Самки крупнее самца, у самца удлинённый первый луч спинного плавника.

Рыба донная, любит полумрак, миролюбива.

Берет любой вид корма.

Сомик крапчатый обладает дополнительным кишечным дыханием и могут дышать кислородом воздуха. Им безразлично количество растворенного кислорода в воде, они могут жить в небольших сосудах без аэрации. Сомики постоянно роются в грунте, выискивая остатки пищи. При этом рыбы взмучивают воду и ухудшают внешний вид аквариума.

Химический состав воды при содержании и разведении значения не имеет.

Температура при содержании и разведении от 20 до 28 °C.

Подготовка к нересту: обильное и разнообразное кормление живым кормом, содержание в просторном аквариуме, предпочтительно самцов и самок отдельно. Нерестовик на 20 л и более высотой 20-25 см заливают свежей водопроводной водой, 2 суток нерестовик аэрируют, после этого в нем можно разместить 1-2 кустика растения с широким и твердым листом. Устанавливают температуру на 2-3 °C ниже, чем при содержании, но не менее 18 °C. В нерестовик высаживают вечером на одну самку 2-3 самцов. Икрометание обычно происходит утром. Икра твердая, приклеивается к листьям растений или стеклу аквариума. После нереста производителей высаживают. Икра сомиков имеет твердую оболочку. Через несколько дней часть икры начинает портиться, ее можно удалить лезвием бритвы или пинцетом. Мальки выходят через 8-10 дней, достаточно крупные.

Кормят мальков коловраткой, артемией и даже мелко нарезанным трубочником.

Самка мечет около 200 икринок. Повторный нерест можно проводить через 7-10 дней.

Альбиносная форма этого сомика с красными глазами сохраняется в потомстве. По содержанию и разведению эта форма ничем не отличается от основного вида.