



Размер до 4 см.

Обитает в водоемах Британской Гвианы.

Самка отличается от самца более округлым брюшком и окраской анального плавника.

Рыбы живут в медленнотекущих или стоячих водоемах, закрытых от прямого света деревьями, с усталым листвой и ветками дном. Вода в таких водоемах богата дубильными веществами и гуминовыми кислотами, что необходимо учитывать при содержании и разведении этого вида.

Нанностомус маргинатус, или карликовый нанностомус наиболее ярко окрашенный и самый популярный представитель вида. Имеет небольшой рот, это надо учитывать при выборе корма. Предпочитает держаться стайкой в средних и верхних слоях воды, где следует оставлять свободные от растительности участки для плавания. Различия в дневной и ночной окраске выражены слабее, чем у других представителей рода.

Перед нерестом производителей целесообразно рассаживать на 2 недели, половозрелыми они становятся после 10 месяцев. Нерестятся круглый год, а продолжительность жизни в аквариуме около 4 лет. Интенсивное и разнообразное кормление производителей перед нерестом - залог успешного разведения.

Вода для содержания: dH до 15°; pH 6,0-7,0; t 22-24° C.

Вода для нереста: dH до 2°; pH 6,2-6,5; t 26-28° C. Карбонатная жесткость минимальная.

Для разведения применяют аквариумы на 5-6 л с нерестовой решеткой при парной посадке на нерест и нерестовики более 30 л - при групповой посадке. При групповом нересте желательно преобладание самцов. Производители активно поедают икру. Производителей помещают в нерестовик вечером, нерест происходит обычно утром. Через сутки выходят личинки, а через 4-5 дней мальки начинают плавать. Нерестовик освещают слабым рассеянным светом. Мальки скапливаются в самом темном месте.

Стартовый корм - науплии циклопа.

Самка мечет до 100 икринок.