

Населяют низовья р. Конго. Держатся в районах порогов и быстрин, среди камней, пещер и гротов.

Длина до 14 см, в аквариуме до 10 см.

Тело вытянуто в длину, постепенно сужается к хвосту, с боков немного уплощено. Голова крупная, губы толстые. Спинной плавник длинный. Тело серо-коричневое с фиолетово-зеленым оттенком. Жаберная крышка и края плавников голубые. Светлая кайма чешуи образует на теле сетчатый рисунок. На боку иногда выступают темные поперечные полосы. На лбу у самца жировая подушка, которая увеличивается с возрастом. У самки лишь слегка намечена.

Рыбы держатся в нижнем слое воды и не трогают рыб верхнего слоя. Из молоди образуются пары, которые захватывают территорию с пещерой и при недостатке пространства сильная пара гоняет остальных. Согласно наблюдениям П. Литша в аквариуме длиной 150 см можно содержать 3 пары рыб. Рыбы любят чистоту и движение воды, требовательны к содержанию кислорода. Можно содержать в общем аквариуме, необходимо прочно установить пещеры и отдельные камни.

Некоторые экземпляры готовясь к нересту могут вырвать растения роя грунт вблизи пещер.

Вода для содержания: 23-26°C, dH 4-20°, pH 6-8.

Корм: живой, дополнительно растительный, заменители.

Нерест может происходить и в общем аквариуме.

Вода для разведения: 25-26°C, dH до 8°, pH 6-7.

Пара откладывает икру в пещере и ухаживает за икрой и потомством. Инкубационный период 4-6 суток, мальки плывут через 5 суток, но еще около 2 недель находятся под присмотром родителей.

Стартовый корм: живая пыль и кроме того пара кормит мальков пережеванной пищей.

Половая зрелость в 1 год.