Населяют восточную часть Африки от устья р. Нил до оз. Мабуту-Сесе-Секо.

Длина до 8 см.

Самец желтовато-серого или желто-зеленого цвета. В период нерест, в зависимости от угла падения света, отливает голубым, зеленым или золотистым блеском.

На жаберной крышке блестящее черное пятно с золотистым окаймлением. Спинной плавник и анальный плавник, в большинстве случаев, ржаво-красного цвета с зелеными лучами, со светло-зеленым краем с черной каймой и с рядами темных пятен. Самка серо-желтого цвета с серебристым блеском.

Вода для содержания: 22-25°C, dH 5-20°, pH 6,5-7,5.

Корм: живой, заменители.

Нерест как в общем, так и нерестовом аквариуме, устроенном также. На нерест сажают самца и 3-4 самки. Стимулирует нерест подъем температуры до 25-28°C. Самец перед нерестом образует территорию, затем делает в песке ямку, в которую самка откладывает икру (до 150 шт.) и после осеменения инкубирует ее во рту.

Икру можно отобрать у самки и перенести в инкубатор. Мальки впервые покидают рот самки через 10-15 суток. За несколько дней до выхода мальков самку целесообразно перевести в отдельный аквариум с грунтом и пещерой.

Стартовый корм: живая пыль.