Длина до 18 см, в аквариуме меньше.

У самца голова блестящего фиолетово-голубого цвета, губы голубые. Передняя часть туловища от красновато-желтого до темно-красного цвета, который постепенно переходит в зелено-голубой на задней части тела. При возбуждении на боку появляются 9-10 поперечных темных полос. Спина оливково-зеленого цвета. Непарные плавники голубые, к краю местами черные. Спинной плавник со светло-голубой каймой. На анальном плавнике несколько красноватых пятен. Парные плавники красноватые, впереди с бело-голубой каймой.

Самка серо-фиолетовая с серебристым блеском и непостоянной интенсивности темными поперечными полосами. Плавники цвета тела, прозрачные, на спинном и хвостовом плавниках светло-голубые пятнышки, спинной плавник со светло-голубой каймой.

Могут скрещиваться с рыбами родов псевдотрофеус и трематокранус.

Нерест происходит как в общем, так и в нерестовом аквариуме (от 100 л).

В нем должно быть достаточное количество укрытий (не менее одного на каждую самку), т.к. самец преследует не готовых к нересту самок. Лучше держать группу рыб, т.к. это не дает возможность сильному самцу сконцентрировать свое внимание на отдельной рыбе и сильно ее преследовать, подчас нанося повреждения.

Икру откладывают на плоский камень, после чего самка инкубирует ее во рту, спрятавшись в укрытие. Примерно через 3 недели мальки впервые покидают рот самки, но еще некоторое время они проводят в нем ночь и прячутся при опасности. Для сохранения мальков незадолго до их выхода можно перевести самку в отдельный аквариум или забрать в первые же дни икру у самки и перенести в инкубатор.

Стартовый корм: науплии циклопа и артемии, моина.

Половая зрелость в 8-15 мес.