



Населяют п-ов Малакка, о-ва Калимантан, Суматра и Ява.

Держатся в светлых, чистых, с медленным течением водоемах.

Длина самца до 19,5 см, самки - до 17,5 см.

Тело коричневатого-желтого цвета, спина темнее, брюхо светлее. При возбуждении, при испуге и во время сна на теле выступают широкие, неправильной формы, темные с фиолетовым отливом поперечные полосы. У молоди рыб под мягколучевой частью спинного плавника выступает темное пятно. Радужная оболочка глаза черного цвета. Самец с более стройным телом.

Спинной и анальный плавники крупнее и сильно вытянуты, на их мягколучевой части, а также на хвостовом плавнике ясно выступает сетчатый рисунок, в стрессовой ситуации в каждой его клетке появляется черное пятнышко. Удлиненные лучи брюшного плавника насыщенно-желтого цвета. Самка более светлая, удлиненные лучи брюшного плавника слегка желтоватые.

Вода: 22-26°C, dH 4-20°, pH 6,5-7,5.

Корм: живой, заменители.

Нерест парный как в общем так и в нерестовом аквариуме длиной от 80 см для пары, с крупнолистными и плавающими растениями. Вода: 26-30°C. Самец образует территорию, очень агрессивен, прогоняет остальных рыб. Он строит гнездо из пены под листьями плавающих растений, но рыбы могут икринетать и без постройки гнезда, под крупными листьями, к которым прикрепляют икру или вообще оставить ее плавать на поверхности. Обычно самец ухаживает за икрой. Описаны случаи когда самка защищала территорию, но обычно ее удаляют из нерестового аквариума. Сытый самец мальков не трогает.

Инкубационный период 1-2 суток, мальки плывут через 3-5 суток.

Стартовый корм: живая пыль.

Половая зрелость в 1 год.