Длина до 15 см.

Наиболее распространена следующая цветная форма: Основная окраска тела самца светло-голубая до лиловой, с темными поперечными полосами на боку. Спинной плавник цвета тела с оранжевой каймой и узкой продольной полосой, хвостовой плавник серо-голубой, анальный плавник цвета тела с 1-2 желтыми икровидными пятнами. Самка блестящего золотичто-желтого цвета. Кроме того встречаются бурая, шафрано-желтая, оранжевая окраски тела.

Вода: 24-28°C, dH 4-20°, pH 7,2-8,5, чистая, еженедельно сменяемая.

Необходимо обратить внимание на удаление отходов и остатков корма, т.к. в процессе нитрификации в щелочной среде происходит образование аммиака.

Корм: растительный (до 60%), живой, заменители.

Пара образуется только в период нереста, который может происходить и в общем аквариуме. Самка инкубирует икру во рту. Икру можно отобрать у самки и перенести в инкубатор.

И. Петровицкий рекомендует в общем аквариуме положить несколько керамических или пластмассовых трубок. После нереста трубку со спрятавшейся самкой перенести в инкубатор. А. Брюльмаер рекомендует за несколько дней до выхода мальков выловить самку и перенести в инкубатор с укрытием и крупной галькой, среди которой спрячутся мальки, покидающие рот самки через 17-24 суток.

Стартовый корм: живая пыль (науплии циклопов и артемии).

Половая зрелость в 8-12 мес.