Размер до 10 см.

Обитает в водоемах Гватемалы.

Самец обычно немного крупнее самки. Концы спинного и анального плавников у самцов имеют вид косицы.

Содержание и разведение несложны и аналогичны условиям, описанным выше. Состав воды для содержания и разведения особого значения не имеет. Температура воды при содержании 18-28 °С. Разводить рыб можно в аквариуме постоянного содержания. Для стимуляции нереста подменяют 1/5 часть воды и повышают температуру на 2-3 °С.

Производители откладывают икру внутрь цветочного горшка или любого другого укрытия. Они активно ухаживают за икрой, выщипывают неоплодотворенные икринки и отгоняют проплывающих мимо рыб. Личинок родители переносят обычно в угол аквариума и продолжают активно охранять их.

Мальков можно выращивать, не отсаживая от производителей.

Стартовый корм - артемия, мелкий циклоп (подпылок) или мелко резанный трубочник.

При разведении цихлид любители часто получают небольшое количество мальков, так как при переносе личинок родителями значительная ее часть теряется. Для получения большого помета применяют следующую методику. После нереста икру вместе с укрытием переносят в отсадник, куда предварительно отливают воду из нерестовика. Рядом с икрой устанавливают точку аэрации и подкрашивают воду метиленовым синим.

Уровень воды при этом должен быть небольшим (7-15 см). Объем отсадника выбирается с учетом возможности дальнейшего (лучше без пересадки) выращивания мальков. По мере роста мальков постепенно ежедневно доливают воду. Это позволяет избежать гибельного для мальков резкого изменения состава воды при ее подмене и стабилизировать значение pH постоянным добавлением свежей воды.