Населяют область от Гайаны до бассейна р. Парагвай.

Длина до 15 см, в аквариуме меньше.

Тело высокое округлое, сильно уплощено с боков, край брюха заострен. Жировой плавник довольно длинный. Спина зеленоватая, серо-голубая или коричневатая, бок блестящий серебристый и в зависимости от угла падения света отливает желтым, зеленым или голубым цветом, брюхо беловатое. В зависимости от места происхождения на боку могут проходить узкие черные поперечные полосы, доходящие сверху до боковой линии, а также темные пятна. Глаз серебристый с вертикальным черным штрихом. Спинной плавник с несколькими черными штрихами и точками.

У самца край анального плавника выгнут, а в период нереста тело приобретает золотисто-красный оттенок. У самки край анального плавника прямой, вытянутый кончик красноватый.

Стайные рыбы, миролюбивы, немного пугливы, иногда выпрыгивают из воды, поедают некоторые виды растений, особенно с мягкими листьями, держатся в среднем слое воды.

Можно содержать в общем, закрытом сверху аквариуме с некрупными рыбами, но предпочтительно большую стаю в видовом. М. Хаух пишет, что рыбы объедали эхинодорусы и валлиснерию, но не трогали криптокорины, которыми он и засадил аквариум.

Вода для содержания: 24-28°C, dH до 15°, pH 6-7,5.

Корм: растительный, живой

Нерест в стае. Икру и потомство не трогают.

Вода для разведения: 26-28 °C, dH до 10°, pH 6-7.

Икра (до 1000 шт.) не клейкая, падает на дно. Инкубационный период 4-6 суток, мальки плывут через 4-6 суток.

Стартовый корм: науплии циклопа, артемии.