



Размер до 7 см.

Распространены в стоячих водах бассейна рек Ориноко и Амазонки.

Половые различия выражены слабо, самка полнее самца.

Рыба плавает вниз головой под углом примерно 45°, поэтому охотно берет корм со дна. Кроме животного корма, необходимо давать растительную пищу, например овсянку, салат, обваренную кипятком крапиву, листья одуванчика.

Вода для содержания: dH до 15°; pH 7,0; t 22-24° C.

Для содержания хилодусов необходим аквариум, густозасаженный растениями и имеющий свободные участки для плавания. Рыба миролюбива, ее можно содержать с любыми другими видами. для успешного разведения хилодусов необходимо вырастить группу рыб при обильном разнообразном кормлении и просторном содержании в чистой воде, подменяемой на 1/4 часть 1 раз в 7-10 дней. По достижении рыбами половой зрелости из группы отбирают пару, проявляющую друг к другу склонность, и высаживают ее в нерестовик на 70-100 л с нерестовой решеткой. В центре размещают куст мелколистных растений и точку аэрации.

Вода для разведения: dH до 3,0°; pH 6,5-7,0; t 26-28° C, насыщение органическими кислотами, дубильными веществами, карбонатная жесткость минимальная.

Свет слабый. При нересте хилодусы принимают горизонтальное положение и меняют окраску. У них появляются пятна под жаберными крышками и пропадает темная продольная полоса. Успех нереста зависит от удачного подбора производителей. Вода и нерестовик при разведении хилодусов должны быть тщательно продезинфицированы. Сразу после икрометания уровень воды в нерестовике понижают.

Икра крупная, с твердой оболочкой. Мальки проходят в икре весь цикл развития и выходят на 5-6-й день. Если малек из икры не выходит на 6-е сутки, но сквозь оболочку видно, что развит и активно двигается, то оболочку икры можно осторожно проколоть булавкой. Мальки крупные, сразу начинают плавать и брать корм.

Стартовый корм - артемия. Половозрелости рыбы достигают в 10 месяцев.