



Населяют Индию, Бирму и Кампучию.

Длина до 5 см.

Тело вытянуто в длину, с боков сильно уплощено, профили спины и брюха почти прямые. Рот верхний. Спинной плавник и анальный плавник отнесены к хвостовому стеблю, грудные плавники крупные, крыловидные, хвостовой плавник двухлопастной. Спина оливковая, бок от желтоватого с голубым отливом до серо-зеленого с серебристым блеском, брюхо почти белое. По телу идет узкая, продольная, темно-голубая полоса, окаймленная сверху золотистой зоной. На полосе по середине тела могут быть 2-5 круглых пятен того же цвета. Непарные плавники желтоватые, остальные бесцветные.

Самец мельче, стройнее, более насыщенно окрашен, непарные плавники при возбуждении становятся красноватыми.

На нерест сажают 1 самца и 2 самки или группу рыб с преобладанием самок. Несколько широколистных и плавающих со свисающими корнями растений, куда рыбы откладывают икру.

Вода для разведения: 26-28°C, понизить dH на 2-3°, pH 6,5-7.

Самка мечет до 100 икринок, которых рыбы почти не преследуют.

Инкубационный период 1 сутки, мальки плывут через 3-4 суток.

Стартовый корм: коловратки, мелкие науплии циклопа.

Половая зрелость в 5-8 мес.