



Населяют область нижнего течения р. Конго. Не сезонный вид.

Длина до 5 см.

Самец голубого до зелено-голубого цвета, спина коричневая, брюхо розовое, на боку и жаберной крышке ряды красных пятнышек и штрихов. Плавники зеленые с красными пятнышками и штрихами. Самка оливково-коричневая с темными точками на боку, плавники бесцветные.

Афиосемионов можно содержать в общем аквариуме, но там они не проявят себя полностью ни в окраске, ни в способе поведения. Лучше видовой аквариум с 1 самцом и несколькими самками или аквариум с другими карпозубыми, причем виды должны занимать разные слои воды. Аквариум с грунтом, который желательно прикрыть вываренным торфом, местами заросли, а также плавающие растения, и достаточно открытого места для плавания, можно положить коряги. Сверху аквариум следует накрыть, т.к. бывают случаи выпрыгивания рыб.

Вода: 22-24°C, dH 4-12°, pH 5,5-7, уровень до 25 см. При смене воды следует учесть, что рыбы чувствительны к изменению ее параметров. Некоторые аквариумисты рекомендуют добавить в воду поваренную соль (1,5 г/л).

Корм: живой (предпочтительно мотыль, коретра, трубочник, энхитреус, дождевые черви), можно нежирную говядину. Рачков (дафния, циклоп) и заменители берут не все рыбы.

По способу размножения рыб можно подразделить на две основные группы. У одной икра развивается без диапаузы, у другой - с ней. Имеется группа рыб, икра которых может развиваться как без диапаузы, так и с ней.

Рыбы держатся в среднем слое воды, пугливы, прыгучи. Аквариум закрыть сверху, создать много тенистых мест.

Вода для содержания: 18-22°C, dH до 10°, pH 6-6,8, свежая вода благоприятно действует на рыб.

Нерестовый аквариум от 5 л.

Вода для разведения: 20-22°C, dH до 5°, pH 6-6,5.

Икрометание среди растений.

Инкубационный период 12-18 суток.