



Размер самца до 6 см, самка несколько мельче.

Обитает в небольших пересыхающих водоемах в Мозамбике и на территории Национального парка Крюгера в ЮАР.

Вода для содержания: dH до 15°; pH 6,0-7,0; t 21-23 °C.

Для профилактики болезней воду можно немного подсаливать. Разведение возможно как в отдельном нерестовике, так и в аквариуме для содержания. Преднерестовая подготовка: комфортное содержание и обильный и разнообразный живой корм. На нерест сажают одного самца и 3-4 самок.

Вода для разведения: dH до 6°; pH около 6,0; t 23-25 °C. Карбонатная жесткость минимальная.

Самец ярко окрашен, самка серо-коричневая с бесцветными плавниками. Условия содержания, кормления и разведения совпадают с описанными для Нотобранхиуса Гюнтера (*Nothobranchius guentheri*)

Срок инкубации икры во влажном торфе 6-10 недель, срок инкубации в сухом торфе можно увеличить до 6 месяцев и более. После окончания инкубации икру заливают свежей мягкой водой с температурой около 25 °C.

Стартовый корм - артемия.

Мальки растут очень быстро. Половозрелости достигают в 1 месяц, после достижения половозрелости икрометание непрерывное.

Срок жизни - 1-1,5 года.