



Размер до 4 см.

Распространена в водоемах восточной части Суматры, Малайского полуострова и Таиланда.

Самец отличается от самки менее полным брюшком и более вытянутым нижним концом клина.

Расбора клинопятнистая - сторожил отечественной аквариумистики. Впервые была завезена к нам в 1911 г., вторично - в 1955 г. Вот как в начале века писал о ней в книге "Новые аквариумные рыбы и растения" Н.Ф. Золотницкий.

"Представьте себе миниатюрную рыбку, на каждой стороне тела которой находится по громадному удлинённому острому треугольнику темно-синего, стального цвета, расположенному на светло-голубом, местами отливающим в розовый цвет фоне. При этом хвостовой и спинной плавники ее окрашены в ярко-малиновый, как у краснопёрки, кровавый цвет, а остальные плавники бледно-розовые. Прелестная эта рыбка невелика, но так красива, что всякий, видевший ее, невольно ею залюбуется".

Расбора любит аквариумы, засаженные растениями, со старой водой и охотно поедает живой и сухой корм. Желательно стайное содержание.

Вода для содержания: dH 15°; pH 6,5-7,0; t 22-24 °C.

Подготовка к нересту заключается в раздельном содержании в просторных аквариумах, в обильном и разнообразном кормлении.

Вода для разведения: dH до 5,0 °; pH 6,2-6,5; t 26-28 °C.

Вводу нужно добавить настой ольховых соплодий до получения янтарного цвета. На нерест сажают пару в нерестовик на 4-5 л. В центре нерестовика устанавливают куст растения с широкими листьями. Освещение слабое. Производители приклеивают икру к нижней стороне листа. Икра очень клейкая. После нереста и высадки производителей нерестовик затеняют. Личинки выходят через сутки, а через 5 дней мальки начинают плавать и их следует кормить.

Стартовый корм - коловратка, науплии циклопа и артемия.

Мальки относительно крупные и быстро растут. Как и всем рыбам, разводящимся в мягкой воде, малькам нужно понемногу добавлять жесткую воду из общего аквариума. Самка мечет до 200 и более икринок.