



Населяют маленькие стоячие водоемы и медленно текущие ручьи от Гвинеи до Либерии.

Длина до 4 см.

Тело вытянуто в длину, невысокое, в передней части слабо, в задней сильнее, уплощено с боков. Спинной плавник отнесен к хвостовому стеблю. Хвостовой плавник факельный. Желтоватое до розового цвета тело пересекают 4 широкие поперечные полосы черного цвета. Плавники, за исключением хвостового плавника, коричневые до желтоватых, у разных популяций эта окраска комбинирует с голубым, красным или коричневым цветом. У самца хвостовой плавник с оранжево-красным полем посередине, ограниченным темно-красными линиями на голубоватом фоне.

Мирные, любящие чистую воду рыбы, прыгучи, держатся в верхнем слое воды. Можно содержать в общем аквариуме с рыбами сходного размера. Аквариум закрыть сверху, местами заросли и плавающие растения.

Вода для содержания: 23-25°C, dH до 10°, pH 6-7.

Корм: живой (плохо берут трубочника и энхитреуса, при кормлении или рыбы хуже растут и теряют в окраске).

Нерестовый аквариум с кустами мелколистных и плавающими растениями со свисающими в воду корнями.

Вода для разведения: 24-26°C (на 1-2°C выше чем при содержании), dH 1-4°, pH 5-6,5. В. Диттман успешно разводил в воде dH 6-8°, pH 6,8-7.

Перед посадкой на нерест самцов и самок держат 1-2 недели отдельно. На нерест сажают 1 самца и 2-3 самки или группу рыб с преобладанием самок.

Нерест растянутый на несколько недель, порционный по несколько икринок (до 10 шт.) в день.

Субстрат с икрой переносят в инкубатор, а на его место вносят новый. Инкубационный период 6-14 суток.

Стартовый корм: живая пыль (инфузории, коловратки).

Половая зрелость в 4 мес.