Населяют Европу от Черного моря до Новой Земли, Азию от Беренгова пролива до Кореи и американское побережье до Калифорнии.

Длина до 9 см, в аквариуме до 6 см.

Тело вытянуто в длину. На хвостовом стебле имеются маленькие роговые пластинки.

Основная окраска тела буро-желтая, брюхо беловато-желтое. У самца на боку множество черноватых точек, и "иглы" белые. В период нереста он становится весь бархатисто-черным. У самки на боку поперечные полосы из извилистых продолговатых пятен. В период нереста спина и бок бархатисто-черные, брюхо остается светлым с множеством черных точек.

Рыбы подвижные, стайные. В период нереста самцы территориальны, агрессивны. Содержат в видовом аквариуме, местами заросли растений. Освещение естественное или включаемые через переменное сопротивление лампы накаливания, т.к. рыбы пугаются и резко бросаются в стороны при мгновенном включении и выключении сильного освещения.

Вода для содержания: 16-22°C, dH до 15°, pH 6,5-7,5, богатая кислородом.

Корм: живой.

Для успешного разведения самцов и самок с осени держат раздельно при 12-16°C. Нерестовый аквариум с грунтом из песка и кустами мелколистных растений. На нерест весной сажают группу рыб из 1 самца и 3-4 самок, температуру постепенно поднимают до 18-20°C, аэрация.

Самец строит гнездо с входом и выходом из молодых побегов растений, плавающих на поверхности. Самки поочередно откладывают в гнездо икру, после чего их удаляют. Самец заботится об икре и мальках. После того как они расплывутся его удаляют.

Стартовый корм: живая пыль.