



Населяют бассейны рек Конго и Нигера, а также верхнее течение р. Замбези.

Держатся в крупных, заросших растениями водоемах со стоячей водой, в лужах и канавах девственных лесов.

Длина до 10 см.

Тело умеренно вытянуто в длину, голова и туловище сверху уплощены, профиль спины почти прямой, брюха - выгнут. Рот верхний. Грудные плавники крыловидные, крупные. Брюшные плавники с вытянутыми в длину лучами. Тело серо-зеленое до серебристо-коричневатого цвета с рисунком из темных штрихов и пятен. Лучи плавников светлые с темными кольцами.

У самца задний край анального плавника с глубоким вырезом, средние лучи образуют трубку. У самки задний край анального плавника прямой.

Рыбы верхнего слоя воды, днем спокойны, вечером оживленно плавают, иногда между ними происходят стычки из-за территории, прыгучи. Можно содержать в общем, закрытом сверху аквариуме (расстояние между покровным стеклом и поверхностью воды не менее 10 см) с рыбами, населяющими нижний и средний слои воды.

Вода для содержания: 24-26°C, dH 5-20°, pH 6-7,5.

Корм: живой, обязательно насекомые (берут мелких рыб).

Закрытый сверху нерестовый аквариум от 50л для пары, плавающие растения.

Вода для разведения: 26-30°C, dH 5-10°, pH 6-7.

Нерест обычно ночью. Икра (100-200шт) на поверхности, ее переводят в инкубатор.

Стартовый корм: мелкий циклоп, через 10 дней мелкий мотыль, плавающий на поверхности воды.